

呕吐和腹泻的清理程序

当有人呕吐时，诺如病毒等病菌可以通过空气传播，污染长达 25 英尺外的表面和食物。消费者和员工可能会直接接触呕吐物或通过呕吐物传播至空气中的诺如病毒，从而感染诺如病毒或其他疾病。

有效清理食品场所的呕吐物和腹泻物应与常规清洁程序不同，其中包括进行更严格的清洁和消毒程序。

清理和响应计划旨在制定适当的程序，以减少对诺如病毒或其他污染物的接触。及时有效地清理至关重要。

首要任务

- 疏散半径 25 英尺内的所有人员并要求他们立即洗手。
- 封锁受污染区域。
- 丢弃半径 25 英尺以内所有未遮盖的食物和一次性容器和用具。
- 清洗和消毒半径 25 英尺内的所有器具和设备。
- 及时将患病员工、顾客和其他人从食品制备、服务和储存区转移出去，最大限度地降低疾病传播的风险。

清理

- 立刻清理掉呕吐物或腹泻物！
 - 穿防护服，包括一次性手套、鞋套、围裙和口罩。如果受污染，立即更换。
 - 用纸巾擦拭呕吐物或腹泻物—用纸巾盖住垃圾，然后小心地拿走纸巾和里面的东西—不要用吸尘器吸！
 - 从清洁区域到污染最严重的区域全部清理一遍，尽量减少传染性物质的传播。
 - 在地毯和室内装饰上使用猫砂、小苏打或其他吸收性材料来吸收液体。
 - 将纸巾/清洁衣物和废物放入塑料垃圾袋或生物危害袋内。
 - 将受污染的桌布、餐巾布和毛巾布放入单独的塑料袋中，以便运送到洗衣店或丢弃。
- 用肥皂水清洗接触过呕吐物或腹泻物的表面和所有附近的表面，如门把手和马桶把手。
- 用清水彻底冲洗，然后用纸巾擦干。
- 清洁和消毒任何用于清理呕吐物和排泄物的非一次性工具（拖把头）及其他设备。
- 将一次性防护服、抹布和毛巾放入密封的垃圾袋中。密封后放置在弃置区。
- 脱掉所有可能被污染的衣服或织物。用洗涤剂 and 热水在最长循环和高温设置下机洗和烘干。

用含氯漂白剂溶液消毒表面

地毯和室内装饰可能更适合采用蒸汽清洗。含氯漂白剂可能会导致永久褪色。混合说明是基于 EPA 认证漂白剂产品的说明，以有效对抗诺如病毒。

- 制备含氯漂白剂溶液（CDC 和 EPA 推荐方式）：
 - 4/3 一杯浓缩漂白剂 + 1 加仑水（浓度约~3500ppm）或
 - 1 杯普通浓度漂白剂 + 1 加仑水
- 使用喷雾瓶，并浸透区域和表面（半径 25 英尺以内）。
- 让表面保持湿润至少 5 分钟。
- 使用前先用清水冲洗所有与食物或口腔接触的表面。

用肥皂水彻底清洗双手

单纯使用洗手液无法抵抗诺如病毒。

环境健康服务

1001 East Ninth Street, Reno, Nevada 89512

775-328-2434 | 传真：775-328-6176 | health@nnph.org

服务于内华达州里诺、斯巴克斯以及沃肖县全境 | 沃肖县是提供平等就业机会的雇主